

# ◆ Révisions – Avril 2024

## Algèbre (2020)

Si  $a$  est un nombre réel, on note  $M_a = \begin{pmatrix} \cos(a) & -\sin(a) \\ \sin(a) & \cos(a) \end{pmatrix}$ . On note  $f_a$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  canoniquement associé à la matrice  $M_a$ .

Par ailleurs, on rappelle que  $(x; y)$  est un élément de  $\mathbb{R}^2$ , la norme réelle  $\|(x; y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$  est la **norme** du vecteur  $(x; y)$ .

### 1. Exemples.

a. Calculer  $M_0$ ,  $M_{\frac{\pi}{2}}$  et  $M_\pi$ . (Autrement dit, calculer  $M_a$  dans les cas  $a = 0$ ,  $a = \frac{\pi}{2}$  et  $a = \pi$ .)

b. On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ . Donner un réel  $a \in [0; 2\pi[$  tel que  $A = M_a$ .

### 2. Premières propriétés. Soit $a \in \mathbb{R}$ .

a. Calculer le déterminant de  $M_a$ . L'application  $f_a$  est-elle bijective? Que dire du noyau de  $f_a$ ?

b. Calculer  $f_a((1; 0))$  et  $f_a((0; 1))$ . En déduire  $\|f_a((1; 0))\|$  et  $\|f_a((0; 1))\|$ .

c. Soit  $(x; y) \in \mathbb{R}^2$ . Prouver que le vecteur  $f_a((x; y))$  et le vecteur  $(x; y)$  ont la même norme.

d. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$  une valeur propre de  $f_a$  et  $u \in \mathbb{R}^2$  un vecteur propre associé.

Montrer que  $\|f_a(u)\| = |\lambda| \times \|u\|$ . En déduire que  $\lambda$  vaut soit 1, soit une autre valeur réelle que l'on précisera.

### 3. On s'intéresse aux valeurs propres **complexes** de $M_a$ .

a. Fixons  $a \in \mathbb{R}$ . Trouver des coefficients  $\alpha$  et  $\beta$  **réels**, que l'on exprimera en fonction de  $a$ , et vérifiant, pour tout nombre complexe  $z$  :

$$(z - e^{ia})(z - e^{-ia}) = z^2 - 2\alpha z + \beta.$$

b. Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Montrer que le déterminant de  $M_a - \lambda I_2$  vaut  $(\lambda - e^{ia})(\lambda - e^{-ia})$ .

c. Pour quelles valeurs de  $\lambda$ , la matrice  $M_a - \lambda I_2$  est-elle *non* inversible?

d. Expliquer pourquoi les valeurs propres (complexes) de  $M_a$  sont  $e^{ia}$  et  $e^{-ia}$ .

4. Application. Existe-t-il un réel  $a$  et une base de  $\mathbb{R}^2$  dans laquelle la matrice de  $f_a$  est la matrice  $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ ? *Indication : chercher d'abord les valeurs propres de cette matrice.*

*Sont-elles de la forme  $e^{ia}$  et  $e^{-ia}$  ?*

5. Si  $a$  et  $b$  sont deux nombres réels, montrer que  $M_{a+b} = M_a M_b$ .

6. Soit  $n$  un entier naturel supérieur ou égal à 2. Montrer qu'il existe un réel  $a \in ]0; 2\pi[$  tel que  $M_a^n = I_2$ . On exprimera un tel réel  $a$  en fonction de  $n$  et de  $\pi$ .

## Algèbre (2024)

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  et la matrice  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ .

1. Montrer que 1 et  $-2$  sont valeurs propres de  $A$ .
2. Donner deux vecteurs propres associés à ces valeurs propres.
3. Donner une matrice  $P$  inversible telle que  $D = P^{-1}AP$ .
4. Calculer explicitement  $P^{-1}$ .
5. Si  $n \in \mathbb{N}$ , exprimer  $A^n$  en fonction de  $P$ ,  $D$ ,  $P^{-1}$  et  $n$ . Justifier en rédigeant une récurrence.
6. Calculer explicitement les quatre coefficients de  $A^n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}$ .

On se donne à présent la suite  $(u_n)$  définies par  $u_0 = 2$ ,  $u_1 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+2} = -u_{n+1} + 2u_n$ .

7. Calculer  $u_2$  et  $u_3$ .
8. Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ , on définit  $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$ . Comparer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , les vecteurs  $AX_n$  et  $X_{n+1}$ .
9. En déduire, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , une expression de  $X_n$  en fonction de  $A$ ,  $X_0$  et  $n$ .
10. Donner enfin, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , une expression de  $u_n$  en fonction de  $n$ .

## Analyse (2023)

Dans cet exercice, on considère la fonction  $f : [1; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie, pour tout réel  $x \geq 1$ , par la relation :

$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

1. On rappelle que la fonction exponentielle  $x \mapsto e^x$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  et positive. Pour tout  $x \geq 0$ , montrer alors que l'on a les deux inégalités :

$$0 \leq e^{-x} - e^{-2x} \quad \text{et} \quad e^{-x} - e^{-2x} \leq e^{-x}.$$

*Ces inégalités pourront être utilisées dans la suite de l'exercice.*

2. Donner le signe de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[1; +\infty[$ .

On **admet** que la fonction  $u : t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$  est continue sur  $[1; +\infty[$ , donc admet une primitive sur  $[1; +\infty[$ . On note  $U$  une primitive de  $u$  dans la suite de l'exercice.

*On ne cherchera pas à calculer  $U$ .*

3. Notons  $g$  la fonction définie sur  $[1; +\infty[$  par la relation  $g(x) = U(2x)$ . Montrer que  $g$  est dérivable sur  $[1; +\infty[$  et prouver que, pour tout  $x \geq 1$ , on a :

$$g'(x) = \frac{e^{-2x}}{x}.$$

4. Montrer que  $f$  est dérivable et que l'on a, pour tout  $x \geq 1$ ,

$$f'(x) = \frac{e^{-2x} - e^{-x}}{x}.$$

5. Donner le sens de variation de la fonction  $f$ .

*On pourra utiliser l'une des deux inégalités de la question 1.*

# Analyse (2020)

On rappelle le résultat suivant :

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et une fonction  $u$  définie et dérivable sur  $I$ . Si on a  $u'(x) = 0$  pour tout réel  $x$  de  $I$ , alors  $u$  est constante sur  $I$ .

On rappelle que la fonction arctangente, notée  $\arctan$ , est la bijection réciproque de la fonction  $\tan : \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[ \rightarrow \mathbb{R}$ . C'est une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  et à valeurs dans  $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ . Elle est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et on a la relation pour tout réel  $x$  :

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

1. Rappeler la valeur de  $\arctan(0)$  et de  $\arctan(1)$ .
2. Rappeler la valeur de la limite de  $\arctan$  en  $+\infty$ .
3. On considère la fonction  $f : x \mapsto \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$ . Calculer la dérivée de la fonction  $f$ .

*Attention, on rappelle que si  $u$  et  $v$  sont deux fonctions dérivables, la dérivée de leur composée est donnée par la formule  $(u \circ v)' = v' \times u' \circ v$ .*

4. Calculer, pour tout  $x$  non nul,  $\arctan'(x) + f'(x)$ .
5. Montrer que, pour tout réel  $x$  strictement positif, on a  $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ . On précisera soigneusement les théorèmes employés.
6. Si  $x$  est strictement négatif, donner la valeur de  $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$ . On rappelle que  $\arctan$  est impaire.
7. Le résultat rappelé au début de l'énoncé reste-t-il vrai si  $I$  n'est pas un intervalle ?
8. Calculer la limite de  $\frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x - 0}$  lorsque  $x$  tend vers 0.
9. En déduire que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 1$ .
10. Donner alors un équivalent **très simple** de la suite  $(u_n)$ , de terme général  $u_n = \frac{\pi}{2} - \arctan(n)$ .

# Probabilités (2020)

Si l'on dispose de  $k$  jetons que l'on place dans  $n$  urnes, combien d'urnes restent vides ? Plutôt que de traiter cette question dans un cas général, on s'intéressera ici au cas où l'on dispose de cinq jetons, dans deux situations : configuration à deux urnes (première partie) puis à trois urnes (parties suivantes). La partie **1.** est indépendante des suivantes.

## 1) Cas simplifié où il n'y a que deux urnes

On dispose de cinq jetons numérotés 1, 2, 3, 4, 5, et de deux urnes  $a$  et  $b$ .

Chaque jeton est placé dans l'une des deux urnes, aléatoirement et sans tenir compte du placement effectué pour les autres jetons. Ainsi, le jeton 1 a une chance sur deux d'être dans l'urne  $a$ , et une chance sur deux d'être dans l'urne  $b$ . Il en est de même pour chacun des quatre autres jetons. On appelle  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de jetons dans l'urne  $a$ .

1. Reconnaître la loi de  $X$ .
2. Exprimer, à l'aide de la variable aléatoire réelle  $X$ , l'évènement « L'urne  $a$  est vide ». Faire de même avec l'évènement « L'urne  $b$  est vide ».
3. En déduire la probabilité de l'évènement « L'un des deux urnes est vide ».

On aborde maintenant le cas général de l'exercice : on dispose toujours de cinq jetons numérotés 1, 2, 3, 4, 5, et de **trois** urnes appelées  $a$ ,  $b$  et  $c$ .

De même que précédemment, chaque jeton est placé aléatoirement dans l'une des trois urnes, et sans tenir compte du placement effectué pour les autres jetons. Ainsi, chaque jeton a une chance sur trois d'être dans l'urne  $a$ , une chance sur trois d'être dans l'urne  $b$ , et une chance sur trois d'être dans l'urne  $c$ .

## 2) Probabilité qu'une urne donnée soit vide

1. Soit  $i \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$  et  $E_i$  l'évènement « Le jeton  $i$  n'est pas dans l'urne  $a$  ». Donner la probabilité de l'évènement contraire  $\bar{E}_i$  puis celle de l'évènement  $E_i$ .
2. Soit  $V_a$  l'évènement « L'urne  $a$  est vide ». Exprimer  $V_a$  en fonction des fonctions  $E_1, E_2, E_3, E_4$  et  $E_5$ .
3. En déduire que  $P(V_a) = \frac{2^5}{3^5}$ .

Par symétrie du problème, on pourra admettre que la probabilité  $P(V_b)$  que  $b$  soit vide et que la probabilité  $P(V_c)$  que  $c$  soit vide ont aussi cette même valeur.

On note désormais  $N$  la variable aléatoire égale au nombre d'urnes vides. L'objectif est de donner la loi de  $N$ .

## 3) Calcul de $P(N = 2)$ et de $P(N = 3)$

1. Que signifie, en français, l'évènement  $(N = 3)$  ? Donner sa probabilité. *On rappelle que chaque jeton doit être contenu dans une urne.*
2. Que signifie, en français, l'évènement  $\bar{V}_a \cap V_b \cap V_c$  ? Calculer  $P(\bar{V}_a \cap V_b \cap V_c)$ .  
On admettra que  $P(V_a \cap \bar{V}_b \cap V_c)$  et  $P(V_a \cap V_b \cap \bar{V}_c)$  sont aussi égales à cette valeur.
3. Calculer la probabilité de l'évènement  $(N = 2)$ . On exprimera dans un premier temps l'évènement  $(N = 2)$  en fonction d'évènements tels que  $\bar{V}_a \cap V_b \cap V_c$ , et d'autres du même genre.

#### 4) Espérance de $N$

On va maintenant calculer l'espérance de  $N$ .

1. On note  $Z_a$  la variable aléatoire qui vaut 1 si l'évènement  $V_a$  est réalisé, et 0 s'il ne l'est pas. On a de même les notations  $Z_b$  ( $Z_b$  vaut 1 si  $V_b$  est réalisé, et 0 sinon) et  $Z_c$  ( $Z_c$  vaut 1 si l'urne  $c$  est vide, et 0 sinon) . Reconnaître la loi et donner l'espérance de ces trois variables aléatoires  $Z_a$ ,  $Z_b$  et  $Z_c$ .
2. On note toujours  $N$  le nombre d'urnes vides. Exprimer  $N$  en fonction de  $Z_a$ ,  $Z_b$  et  $Z_c$ .
3. Calculer alors l'espérance de  $N$ .

#### 5) Loi de $N$

1. Montrer que  $P(N = 1) + 2P(N = 2) = \frac{2^5}{3^4}$ .
2. En déduire la valeur de  $P(N = 1)$ .
3. Donner enfin le loi de la variable aléatoire  $N$ . On répondra sous la forme d'un tableau, aucune justification n'est attendue.

# Probabilités (2023)

Dans cet exercice, on fixe  $p$  et  $q$  deux réels appartenant à l'intervalle  $]0; 1[$ .

On considère la situation d'un chat domestique. Son propriétaire quitte chaque matin la maison et ne rentre que le soir. Chaque jour, à l'instant du départ de son propriétaire, le chat est confronté à un choix : ou bien rester à la maison, ou bien décider de passer la journée dehors. Les ouvertures de la maison étant toutes closes, et la porte d'entrée de la maison ne disposant par de chatière, le chat devra passer sa journée soit entièrement à l'intérieur, soit entièrement à l'extérieur de la maison. On se rend compte que, lorsque le chat choisit de rester à l'intérieur de la maison un jour donné, la probabilité qu'il choisisse de rester de nouveau à la maison le lendemain est égale à  $p$ . Lorsque le chat passe la journée dehors, la probabilité qu'il décide de rester dans la maison le lendemain vaut  $q$ .

Tout ceci se déroule sur une période de temps où les jours sont indexés par  $\mathbb{N}^*$ , c'est-à-dire qu'ils sont numérotés  $1, 2, 3, \dots$ ; de façon générale, un jour possède un numéro  $n$  non nul. Ceci autorise, pour tout entier naturel  $n$  strictement positif, à considérer les événements  $A_n$  et  $B_n$  suivants :

$A_n$  : « le chat reste à la maison le  $n$ -ème jour »

$B_n$  : « le chat passe la journée dehors le  $n$ -ème jour ».

Ainsi,  $B_n$  est simplement l'évènement contraire de  $A_n$ . On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $a_n = P(A_n)$  et  $b_n = P(B_n)$ . On suppose qu'au premier jour le chat choisit de rester la journée dehors, ainsi  $a_1 = 0$  et  $b_1 = 1$ .

1. Quelle relation simple existe, pour tout entier naturel  $n$  non nul, entre  $a_n$  et  $b_n$  ?
2. On considère les égalités suivantes, dont certaines traduisent correctement l'énoncé, et d'autres non :

$$\begin{array}{llll} P_{A_n}(A_n) = p ; & P_{A_{n+1}}(A_n) = p ; & P(A_n \cap A_{n+1}) = p ; & P_{A_n}(B_{n+1}) = p ; \\ P_{A_n}(A_{n+1}) = p ; & P_{A_n}(B_{n+1}) = q ; & P_{B_n}(A_{n+1}) = q ; & P_{B_n}(A_{n+1}) = p. \end{array}$$

Recopier sur votre copie les égalités justes, c'est-à-dire celles qui traduisent l'énoncé correctement. On ne demande pas de corriger les autres. On rappelle que la notation  $P_X(Y)$  désigne la probabilité conditionnelle de l'évènement  $Y$  sachant l'évènement  $X$ .

3. Donner les valeurs des  $P_{B_n}(B_n)$  et de  $P_{B_n}(B_{n+1})$  pour tout entier naturel  $n$  non nul.
4. Prouver que, pour tout entier naturel  $n$  non nul, on a la relation :

$$a_{n+1} = (p - q)a_n + q.$$

5. On note  $\ell = \frac{q}{1 + q - p}$ .

- a. Montrer que  $1 + q - p$  est non nul (et donc que le réel  $\ell$  est bien défini).
- b. Simplifier l'expression  $(p - q)\ell + q$ .
- c. Montrer que l'on a  $a_n = -\ell(p - q)^{n-1} + \ell$  pour tout entier naturel  $n$  non nul.

*Indication : raisonner par récurrence.*

- d. Pour  $n \geq 1$ , on pose  $X_n$  la variable aléatoire valant 1 si la chat reste à la maison le  $n$ -ème jour, et valant 0 sinon. Donner la loi, l'espérance et la variance de  $X_n$  en fonction de  $a_n$ .